

En caso de urgencia, por favor, avisen a:

Nombre del médico: _____

Número de teléfono del médico: _____

Por favor, notifiquen también a:

Nombre: _____

Teléfono: _____

Parentesco: _____

Información para el profesional sanitario:

- No deben utilizarse los valores de INR ya que no son una medida válida de la actividad anticoagulante de Rivaroxaban Denk.

¿Qué tengo que saber acerca de Rivaroxaban Denk?

- Rivaroxaban Denk hace la sangre más fluida, lo que previene la formación de coágulos de sangre.
- Debe tomar Rivaroxaban Denk exactamente como el médico se lo haya indicado. Para asegurar una protección óptima frente a la formación de coágulos, **no deje de tomar nunca una dosis.**
- No deje de tomar Rivaroxaban Denk sin consultar antes con su médico, ya que esto aumentaría el riesgo de que se formen coágulos de sangre.
- Informe a su médico de cualquier otro medicamento que esté tomando, ha tomado recientemente o vaya a empezar a tomar, antes de tomar Rivaroxaban Denk.

- Diga a su médico que está tomando Rivaroxaban Denk antes de una intervención quirúrgica o de un procedimiento invasivo.
- moratones anormales, sangrado por la nariz, las encías o cortes que tardan mucho en dejar de sangrar
- flujo menstrual o sangrado vaginal más abundante de lo normal
- sangre en orina, que puede ser de color rosado o marrón, deposiciones de color rojo o negro
- tos con sangre o vómitos de sangre o de un material que tiene aspecto de grumos de café

¿Cuándo debo pedir consejo al profesional sanitario?

Si toma un anticoagulante como Rivaroxaban Denk es importante que conozca sus posibles efectos adversos.

El efecto adverso más frecuente es el sangrado. No empiece a tomar Rivaroxaban Denk si sabe que tiene riesgo de presentar un sangrado sin hablarlo antes con su médico.

Dígale inmediatamente al profesional sanitario si usted tiene algún signo o síntoma de sangrado, como por ejemplo

- dolor
- hinchazón o molestias
- dolor de cabeza, mareos o debilidad

- Para garantizar una protección óptima, Rivaroxaban Denk – 10 mg puede tomarse con o sin alimentos.
- Rivaroxaban Denk – 15 mg debe tomarse con alimentos.
- Rivaroxaban Denk – 20 mg debe tomarse con alimentos.

¿Cómo debo tomar Rivaroxaban Denk?

- Para garantizar una protección óptima, Rivaroxaban Denk – 10 mg puede tomarse con o sin alimentos.
- Rivaroxaban Denk – 15 mg debe tomarse con alimentos.
- Rivaroxaban Denk – 20 mg debe tomarse con alimentos.



TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Rivaroxaban Denk 10 mg

Rivaroxaban Denk 15 mg

Rivaroxaban Denk 20 mg

Lleve siempre consigo esta tarjeta.

Muestre esta tarjeta a todos los médicos o dentistas antes de recibir otro tratamiento.

Estoy recibiendo tratamiento anticoagulante con Rivaroxaban Denk (rivaroxabán)

Nombre: _____ Dirección: _____

Fecha de nacimiento: _____ Peso: _____

Otros medicamentos / afecciones: _____



PATIENT ALERT CARD

Rivaroxaban Denk 10 mg

Rivaroxaban Denk 15 mg

Rivaroxaban Denk 20 mg

Keep this card with you at all times

Present this card to every physician or dentist prior to treatment

I am under anticoagulation treatment with Rivaroxaban Denk (rivaroxaban)

Name: _____ Address: _____

Birth date: _____ Weight: _____

Other medicines / conditions: _____

In case of emergency, please notify:

Doctor's name: _____

Doctor's phone: _____

Please also notify:

Name: _____

Phone: _____

Relationship: _____

Information for health care providers:

- INR values should not be used as they are not a dependable measure of the anticoagulant activity of Rivaroxaban Denk.

What should I know about Rivaroxaban Denk?

- Rivaroxaban Denk thins the blood, which prevents you from getting dangerous blood clots.
- Rivaroxaban Denk must be taken exactly as prescribed by your doctor. To ensure optimal protection from blood clots, **never skip a dose.**
- You must not stop taking Rivaroxaban Denk without first talking to your doctor as your risk of blood clots may increase.
- Tell your health care provider about any other medicines you are currently taking, took recently or intend to start taking, before you start Rivaroxaban Denk.

- Tell your health care provider that you are taking Rivaroxaban Denk before any surgery or invasive procedure.

When should I seek advice from my health care provider?

When taking a blood thinner such as Rivaroxaban Denk it is important to be aware of its possible side effects.

Bleeding is the most common side effect. Do not start taking Rivaroxaban Denk if you know you are at risk of bleeding, without first discussing this with your doctor.

Tell your health care provider straight away if you have any signs or symptoms of bleeding such as the following:

- pain
- swelling or discomfort
- headache, dizziness or weakness

- unusual bruising, nosebleeds, bleeding of gums, cuts that take a long time to stop bleeding
- menstrual flow or vaginal bleeding that is heavier than normal
- blood in your urine which may be pink or brown, red or black stools
- coughing up blood, or vomiting blood or material that looks like coffee grounds

How do I take Rivaroxaban Denk?

- To ensure optimal protection, Rivaroxaban Denk – 10 mg can be taken with or without food.
- Rivaroxaban Denk – 15 mg must be taken with food.
- Rivaroxaban Denk – 20 mg must be taken with food.